

第11回(2025年度)春の交換会種子リスト

番号	和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等)[提供者コメント]「採種地」提供者番号
	-----【アカバナ科】-----
00509	アカバナ(<i>Epilobium pyrricholophum</i>)(15-90、紅紫、北海道から九州)3
	-----【アブラナ科】-----
00850	アエチオネマ アルメヌム(モロッコナズナ)(<i>Aethionema armenum</i>)(5、ピンク小さい花がボール状、トルコ、800m以上山地)10
00971	ダイセンハタザオ(<i>Arabis sp.</i>)(15-20、白)7
01080	マルバコンロンソウ(<i>Cardamine tanakae</i>)(5-15、白、コンロンソウより小型)29
01176	シリベシナズナ(通称キリギシナズナ)(<i>Draba igarashii</i>)(10-20、白、特定国内希少種、絶滅危惧 IA類)25
01182	キタダケナズナ(ハクホウナズナ)(<i>Draba kitadakensis</i>)(10-20、白、南アルプス、奥秩父、絶滅危惧 IB類)25
01192	イヌナズナ(<i>Draba nemorosa</i>)(10、黄、二年草、北海道から九州、和名は食べられないという意味から)3
01194	クモマナズナ(<i>Draba nipponica</i>)(5-10、白、本州中部、高山帯)7
01219	シロウマナズナ(<i>Draba shiroumana</i>)(10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧 IB類)25
	-----【アヤメ科】-----
01616	バビアナ ストリクタ(<i>Babiana stricta</i>)(10-30、紫、南アフリカ、USDAゾーン8-10)35 
01695	クロクス ゴウリミー(<i>Crocus goulimyi</i>)(青色系の花、ギリシャ原産)[少量]35 
01785	フリーシア ビリディス(<i>Freesia viridis</i>)(30、緑色の花、半耐寒性→アキダンテラ ビリディス(<i>Acidanthera viridis</i>))10,35
01786	フリーシア ムイリー(<i>Freesia x muirii</i>)(5-15、白にほんのり黄のスポット)35 
01877	ヘスペランサ ククルタ(<i>Hesperantha cucullata</i>)(15、表は白、裏暗赤、秋蒔き、3~5月咲き、夕方咲き) 22 
01881	ヘスペランサ オリガンサ(<i>Hesperantha oligantha</i>)(10-15、濃桃、秋蒔き、2~3月咲き、ケープ州)[発芽2年目に開花]22,35 



01995 イリス ルテニカ ナナ(マンシュウコアヤメ)(*Iris ruthenica* var. *nana*)(10、青紫、中国東北部)[保湿種子]24

02043 キバナカキツバタ(オオキンカキツ)(*Iris koreana*)(20、黄、学名から韓国産か? [保湿種子]24

02073 ラペイロウシア ヤククイニー(*Lapeirousia jacquinii*)(10、紫、半耐寒性)5,35



02122 モラエア ポリスタキス(*Moraea polystachys*)(40、青紫、秋冬咲)22



02128 モラエア SP-1(*Moraea* SP-1)(20、黄 中心部に斑点、秋蒔き、3月咲き)22



02137-B モラエア トリコロール(むかご)(*Moraea tricolor*)(15、黄に赤筋模様、2月咲)22



02298 スパラキス グランディフロラ フィンブリアータ(*Sparaxis grandiflora* subsp. *fimbriata*)(10-25、白、裏に紫少々、秋蒔き、4月咲き、ケープ州)22,35



02300 スパラキス バリエガタ(*Sparaxis variegata*)(20-25、紫、半耐寒性、南アフリカ)35



-----【イヌサフラン科】-----

02549 コルキクム カベンセ キリオラツム(*Colchicum capense* ssp. *ciliolatum*)(8、ほぼ白、秋蒔き、1~2月咲き、子苗でも開花しやすいタイプ)22



-----【イネ科】-----

- 02800 コバンソウ(*Briza maxima*)(30、黄緑、一年草、原産地はヨーロッパ、明治期に渡来)32
02802 ヒメコバンソウ(*Briza minor*)(10-60、ヨーロッパ原産、帰化植物)32

-----【ウマノスズクサ科】-----

- 04535 ガビサンカンアオイ(通称?)(*Asarum caudigerum* var. *caudigerum*)(緑、中国産、オナガサイシンに似る)[保湿種子、実生での斑入りは未確認]35
04650 サルマヘンリー(*Saruma henryi*)(20、黄、耐寒性あり、中国南部)30

-----【オオバコ科】-----

- 05209 サンイントラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) ogurae*)(15-30、青、絶滅危惧Ⅱ類、島根県)28
05215 キクバクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum*)(5-20、紫、北海道、千島)22

-----【オミナエシ科】-----

- 05524 オミナエシ(*Patrinia scabiosifolia*)(60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州)28

-----【キク科】-----

- 07186 オオバナケラ(アカバナオケラ)(*Atractylodes macrocephale*(*ovata*))(30-60、赤、中国原産)29
07976-1 ツワブキ(変わり葉)(*Farfugium japonicum*)(20-30、黄)1
08150 チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピヌム)(*Hieracium alpinum*)(10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ)17
08159 ウズラバタンポポ(*Hieracium maeulatum*)(20、黄、紫褐色の斑入り葉)16
08369 チシマウスユキソウ(*Leontopodium kuriense*)(10-25、白、海岸の岩場、南千島)[少量、数粒のみ、種子交換会で精製]20
08990 シロバナタンポポ(*Taraxacum albidum*)(30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可能、本州関東以西)23

-----【キジカクシ、クサスギカズラ科】-----

- 09199 アルブカ スコエンランディ(*Albuca schoenlandii*)(150-、薄黄、温暖地では多年草)35
09204 アルブカ スピラリス(*Albuca spiralis*)(15、白、球根、園芸種の「フリズルシズル」より葉の巻きは小さい、南ア・ケープ)35



- 09419 ヒアキントイデス マウリタニカ(*Hyacinthoides mauritanica*)(10-15、青、モロッコ)35



- 09431 ラケナリア アロイデス(*Lachenalia (Polyxena) aloides*)(20、赤、黄、南アフリカ原産)35



- 09433 ラケナリア コンミナタ(*Lachenalia (Polyxena) contaminata*)(30、白、細葉)35
09435 ポリキセナ エンシフォリア(*Lachenalia (Polyxena) ensifolia*)(5-10、ピンク、多肉質葉の間にピンク小花、南ア)14,35
09440 ポリキセナ ロングツバ(*Lachenalia (Polyxena) longituba*)(-10、白、南アフリカ原産)3
09442 ポリキセナ マウガニー(*Lachenalia (Polyxena) maughanii*)(10、白、ヒヤシンスを小型化した様な花、南アフリカ)35
09443 ラケナリア ムタビルス(*Lachenalia (Polyxena) mutabilis*)(20-30、青から紫に咲く、半耐寒性、南アフリカ)35



- 09449 ラケナリア プシラ(*Lachenalia (Polyxena) pusilla*)(5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。)1
- 09452 ラケナリア レフレクサ(*Lachenalia (Polyxena) reflexa*)(10-20、黄)1,14,15,22,35
- 09453 ラケナリア ルビダ(*Lachenalia (Polyxena) rubida*)(10-25、桃一赤)35
- 09456 ポリキセナ ピグマエア(*Lachenalia (Polyxena) pygmaea*)(10-20、ピンク)[少量]23
- 09456-1 ポリキセナ ピグマエア(白花)(*Lachenalia (Polyxena) pygmaea*)(10-20、白)[少量]23
- 09486-1 マッソニア ディプレッサ(ピンク)(*Massonia dipressa*)23
- 09486-B マッソニア ディプレッサ(小球根)(*Massonia dipressa*)(10、白、2枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)21
- 09487 マッソニア ロンギペス(*Massonia longipes*)(10、白、4枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)35
- 09489 マッソニア プスツラタ(*Massonia pustulata*)(10、白、2枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)1
- 09491 マッソニア ヒルスタ(*Massonia hirsuta*)(10、白、纖毛状の縁を持つ反曲した苞をもつ。小型種、南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)[少量]23
- 【キヨウチクトウ科】-----
- 09813 ヒメイヨカズラ(*Tylophora matsumurae*)(10、黄緑 小さな花)28
- 09831 ナンゴクカモメヅル(*Vincetoxicum austrokiusianum*)(ツル、花冠は白色、基部が淡紅色、九州南部、絶滅危惧 I B類)8
- 【キンチャクソウ科】-----
- 09903 カルセオラリア メキシカナ(*Calceolaria mexicana*)(30-50、黄、多年草、半耐寒性)[秋播きすれば、翌春に開花、余り暑さに強くないので、1年草扱いが可能]35
- 【キンバイザサ科】-----
- 09915 コキンバイザサ(*Hypoxis aurea*)(黄、日本では同属種はこの種のみ、宮城以南琉球まで)28
- 【キンポウゲ科】-----
- 10035-3 フクジュソウ(紅花系)(*Adonis ramosa*(= *amurensis*))(20)1
- 10042 シコクフクジュソウ(*Adonis shikokuensis*)(20、黄、石灰岩地の落葉樹林帯、四国九州、絶滅危惧 II 類)11
- 10042-1 シコクフクジュソウ(花はオレンジ色)(*Adonis shikokuensis*)(絶滅危惧 II 類)9
- 10072 オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州)6,13,21
- 10072-E オキナグサ(新潟県由来)(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫)9



- 10072-W (W)オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州)[栃木県]18
10073 キバナオキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua* var. *flaba*)(30-50、薄い黄)27
10073-2 素心オキナグサ(八重咲)(*Anemone (Pulsatilla) cernua* var. *flaba*)(30-50、薄い黄)「白翁か」8
10082 プルサチラハレリスラビカ アルバ(*Anemone (Pulsatilla) halleri* ssp. *slavica alba*)(20、白、カルパチラ山脈西部)21
10211-W (W)イチリンソウ(*Anemone nikoensis*)(20-30、白、本州から九州、種子は完熟前にこぼれるので、湿潤状態で後熟する、発芽は2年目。いきなり本葉がでてくる)[東京都]26
10260 バイカカラマツ(*Anemonella thalictroides*)(10-20、平地や山地の林床/林縁)28
10293 ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶・黄、距が曲がらずまっすぐ、北海道から九州、草地、林縁)30
10332 フウリンオダマキ(*Aquilegia ecalcarata*)(20-30、白薄い紫、中国、1800-3500m)25
10352 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫、葉が3全分裂する。オダマキは完全に分裂しない)7,28
10352-E2 ミヤマオダマキ(ハケ岳系、ピンク)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、ピンク)25
10352-E6 ミヤマオダマキ(アポイ岳系)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(青紫)7,18
10352-E9 ミヤマオダマキ(白馬岳系か)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)7
10354 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* f. *alba*)26
10354-2 ミヤマオダマキ(白)(ヤマオダマキとの交雑種？)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* f. *alba* sp)[花は青みを帯びた白、草丈は30-40]30
10497 リュウキンカ(*Caltha palustris* var. *nipponica*)(15-50(花茎)、黄)18
10621 セリバオウレン(*Coptis japonica* var. *dissecta*)(10-30、白、2回3出複葉、本州四国)7
10625 オオゴカヨウオウレン(別名屋久島ゴヨウオウレン)(*Coptis quinquefolia* var. *ramosa*)(5-10、白、屋久島固有種)9
10627 バイカオウレン(*Coptis quinquefolia*)(15、白)29
10718 アズマシロカネソウ(*Dichocarpum nipponicum*)(10-20、白っぽく外は紫色に帯びる。下向きに咲く。)18
10720 サンインシロカネソウ(ソコベニシロカネソウ)(*Dichocarpum ohwianum*)(5-20、淡い黄(基部赤褐色)、島根県から福井県、湿りけの多い場所)18
10723 トウゴクサバノオ(*Dichocarpum trachyopermum*)(10-20、白(薄い黄)、日本固有種、本州岩手以南)18,25
10744 セツブンソウ(*Eranthis pinnatifida*)(5-15、白、関東以西本州、主に太平洋側)1,6,13,18
10744-s セツブンソウ(*Eranthis pinnatifida*)(5-15、白、関東以西本州、主に太平洋側)[殺菌処理]6,17
10744-1 セツブンソウ(八重咲き)(*Eranthis pinnatifida*)9



- 10744-3 セツブンソウ(白花)(*Eranthis pinnatifida*)[素心]31
10744-3d セツブンソウ(白花)(*Eranthis pinnatifida*)[乾燥種子]29
10745 キバナセツブンソウ(園芸名)(*Eranthis x tubergenii* (*hyemalis* x *cilicica*)))(10-20、黄、日本で出回っているものは、地中海東部原産のキバナセツブンソウ(*E.cilicica*)と南欧原産のオオバナキバナセツブンソウ(*E.hyemalis*)との交雑種という。)2,35
10862-3 雪割草(交配種)2、3段系(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)9
10862-6 雪割草(標準/二段咲き、白覆輪、混合)(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)21
10862-13 雪割草(交配種)親株「満天の星」(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)(150-、薄黄、温暖地では多年草)[乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4
10862-14 雪割草(交配種)親株「雪まつり」(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)[乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4
10862-15 雪割草(交配種)親株「桃色絞り」(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)[乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4

- 10862-16 雪割草(交配種)親株「大車輪」(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)[乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4
 11000 ヒメウズ(*Semiaquilegia adoxoides*)(10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端)2
 11020 コハスバカラマツ(*Thalictrum coreanum* var. *minor*)(15-30、薄紫、朝鮮半島)5,35
 11079 ムラサキカラマツ(*Thalictrum uchiyamae*)(50、薄紫、対馬と濟州島のみ分布、特定国内希少種、絶滅危惧 I B類)25
 11081 タカサゴカラマツ(タイワンバイカラマツ)(*Thalictrum urbainii*)20、白(口紅赤)、台湾原産19
 11081-1 タカサゴカラマツ(タイワンバイカラマツ)白花(*Thalictrum urbainii*)20、白(青軸)、台湾原産19

【ケシ科】

- 11551 ジロボウエンゴサク(*Corydalis decumbens*)(10-20、薄い紫、実は線形のさく果、熟すると自然に散布される。関東地方から九州)2,31
 11554-1 オトメエンゴサク(花が赤紫タイプ)(*Corydalis fukuharae*)(10-20、赤紫、エゾエンゴサクの本州タイプ)31
 11555-W (W)エゾエンゴサク(*Corydalis fumariifolia* subsp. *azurea*)(10-20、空色、学名見直し*Corydalis ambigua*から変わる、北海道のみ、本州に分布するのはオトメエンゴサク*Corydalis fukuharae*とされる)[北海道]21
 11670-W (W)ヤマブキソウ(*Hylomecon japonicum*)(10-20、黄)[東京都]26
 11850-d サンギナリア カナデンシス(*Sanguinaria canadensis*)(20-30、白、一重、多弁、八重咲きがある。山地の林床、林縁)[乾燥種子]14

【サクラソウ科】

- 12381 ルリハコベ(*Anagallis arvensis* f. *coerulea*)(10-20、青紫、1年草、伊豆七島・紀伊半島・四国・九州・琉球)25,29
 12471 リュウキュウコザクラ(*Androsace umbellata*)(5-10、白、1年草、中国地方から沖縄、海近くの草地)20,25
 12553 シクラメン コウム(銀葉)(*Cyclamen coum* silver leaf)(葉の中が銀色)28
 12583 シクラメン ヘデリフォリウム「ルビーストレイン」(*Cyclamen hederifolium* 'Ruby strain')(10、濃いピンク)3

【サトイモ科】

- 13251-B アルム キレナイクム(小球根)(*Arum cyrenaicum*)(15-25、赤紫の仏炎苞を持つ、耐寒性は-12°Cまで、リビア)21
 13255-B アルム イタリクム(小球根)(*Arum italicum*)(30-45、白の仏炎苞、耐寒性USDA5-9、地中海沿岸)21

【シソ科】

- 14633 タテヤマウツボグサ(*Prunella prunelliformis*)(15、紫、ミヤマウツボグサに似るが本種は葉柄がない東北地方から中部地方、亜高山、高山の草地)7



- 14635 ウツボグサ(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica*)(20、青、北海道から沖縄)32
 14800 アツバタツナミソウ(*Scutellaria tzusimensis*)(10-30、青紫、対馬)21
 14711 ハルノタムラソウ(*Salvia ranziana*)(10-20、白、日本固有種、紀伊四国九州)19
 14790 アカボシタツナミソウ(*Scutellaria rubropunctata*)(20-50、淡紫、奄美大島～沖縄諸島)35
 14790-1 アカボシタツナミソウ(濃色タイプ)(*Scutellaria rubropunctata*)(20-50、青紫、奄美大島～沖縄諸島)35

【シユロソウ科】

- 14945 ツクシショウジョウバカマ(*Heloniopsis (Heloniopsis) orientalis* var. *breviscapa*)(10-20、淡ピンク、九州)[少量、乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4
 14946 シロバナショウジョウバカマ(*Heloniopsis (Heloniopsis) orientalis* var. *flavida*)(10-20、白、)[少量、乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4
 14948 ショウジョウバカマ(斑入り)(*Heloniopsis (Heloniopsis) orientalis* variebata)(10、白～黄斑入りピンク)[極少量、乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4

【スミレ科】

- 15765-3 ヒゴスマリ(素心)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*)(青軸)16
 15827 シロバナタチツボスミレ(*Viola grypoceras* f. *albiflora*)(10、白)16,19
 15856 ヒメスマリ(*Viola inconspicua* ssp. *nagasakiensis*)(濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。微香、低地)16

- 15861-1 シロバナツクシコスミレ(斑入り)(*Viola japonica* f. *albida*)(白、コスミレの白花、シロバナコスミレ(俗名))29
- 15889 スミレ(*Viola mandshurica*)(通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土)19
- 15893 スミレ(白花)(*Viola mandshurica* f. *alba*)(白変種)[素心]29
- 15894 ニシキスミレ(*Viola mandshurica* f. *albo-variegata*)(紫、スミレの斑入り、実生でほぼ100%斑入り出現)19
- 15910 アツバスミレ「二色アツバスミレ」(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *bicolor*)(10、白・紫)16,29
- 15951 クワガタスミレ(*Viola palmate*)(10、青紫、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米)19
- 15952 クワガタスミレ(白)(*Viola palmate white fl.*)(10、白、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米)19
- 15977 ビオラ プベスケンス(*Viola pubescens*)(レモン黄、暑さに強いが、夏は休眠しやすい、北米東部)29
- 16005 フイリミヤマスミレ(*Viola selkirkii* f. *variegata*)(紅紫、葉脈の沿って白い斑が入る)19
- 16054 シロバナフイリゲンジスミレ(*Viola variegata* sp.)(白、葉脈の沿って白い斑が入る)29
- 16088 シロノジスミレ(*Viola yedoensis* f. *albescens*)(白)16
- 16099 アソヒカゲスミレ(*Viola yezoensis* var. *asoana*)(15、春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる)16
- 【セリ科】-----
- 16264 ヤクシマセントウソウ(*Chamaele decumbens* var. *micrantha*)(3-10、白、絶滅危惧 I B類)29
- 16423 キイウマノミツバ(Sanicula lamelligera var. *wakayamensis*)(10-15、濃青、絶滅危惧 I A類)[保湿種子、少量]35
- 【センリョウ科】-----
- 16510 キビヒトリシズカ(*Chloranthus fortunei*)(白、花は糸状、岡山香川九州北部、絶滅危惧 II類)12
- 16510-1 キビヒトリシズカ(青軸)(*Chloranthus fortunei*)(白、花は糸状、岡山香川九州北部、絶滅危惧 II類)12
- 16512 ヒトリシズカ(*Chloranthus japonicus*)(10-25、白)17,21
- 16512-4 斑入りヒトリシズカ(砂子斑)(*Chloranthus japonicus*)(5-7、)[保湿種子、実生での斑入りは未確認]35
- 16513-E フタリシズカ(屋久島由来か?)(*Chloranthus serratus*)(15、白)12
- 【ツリフネソウ科】-----
- 17594 キツリフネ(*Impatiens noli-tangere*)(40-80、黄、一年草、北海道から九州)30
- 【テコフィラエア科】-----
- 17630 キアネラ アルバ(*Cyanella alba*)(白、南アフリカ、耐寒性は弱い)35
- 
- 17640 テコフィラエア キアノクロックス(*Tecophilaea cyanocrocus*)(5-10、コバルトブルー、アンデス)35
- 17643 テコフィラエア ヴィオリフロラ(*Tecophilaea violiflora*)(15、小型紫。実生4年で開花。)5,35
- 【ナデシコ科】-----
- 18392 ハマツメクサ(*Sagina maxima*)(5-25、白、海岸の岩場や砂地、北海道から九州)3
- 【バラ科】-----
- 19763 ヤクシマヘビイチゴ(ヤクシマシロバナヘビイチゴ)(*Fragaria nipponica* var. *yakusimensis*)(白、絶滅危惧 I A類)30
- 【ヒガンバナ科】-----
- 20528 ハマラッキヨウ(*Allium litorale*)(20-30、淡紅紫、関東から東海)20
- 20560 タマムラサキ(*Allium pseudojaponicum*)(10-30、紫、鹿児島奄美大島、海岸近く)25
- 20776 ナルキスス ブルボコディウム(*Narcissus bulbocodium*)(10-20、黄、地中海沿岸原産)35
- 
- 20788 ナルキスス ブルボコディウム オベスス(*Narcissus bulbocodium* ssp. *obesus*)(10、濃黄、スペイン原産)35

20797	ナルキスス カンタブリクス(<i>Narcissus cantabricus</i>)(白、細い葉、冬咲き、スペイン西部から北アフリカ)35
20828	ナルキスス ロミエウキシー(<i>Narcissus romieuxii</i>)(15-25、黄、やや上向きに咲く)35
	
20840	ナルキスス スカベルラス(<i>Narcissus scaberulus</i>)(黄、スペイン原産)1
20841	ナルキスス セロチヌス(<i>Narcissus serotinus</i>)(白、秋咲き)1
20846	ナルキスス トリアンドルス(<i>Narcissus triandrus</i>)(クリーム、下向きの風鈴の様な花、ヨーロッパ南部)35
	

-----【ベンケイソウ科】-----

21950	オオベンケイソウ(<i>Hylotelephium spectabile</i>)(25-80、ピンク、東アジア帰化植物)[種子交換会で精製]20
-------	---

-----【ムラサキ科】-----

24351-W	(W)ヤマルリソウ(<i>Omphalodes japonica</i>)(7-20、淡青紫、日本固有種、福島以西四国九州)[東京都]26
---------	---

-----【メギ科】-----

24469	イカリソウ(<i>Epimedium grandiflorum</i> var. <i>thunbergianum</i>)(15、淡桃)[保湿種子]6
24473	キバナイカリソウ(<i>Epimedium koreanum</i>)(20-40、薄黄、本州日本海側、北海道)[保湿種子、少量]35

-----【ユキノシタ科】-----

25209	ネコノメソウ(<i>Chrysosplenium grayanum</i>)(5-20、淡黄、本州から北海道)2
25210	ヤマネコノメソウ(<i>Chrysosplenium japonicum</i>)(10-20花茎、緑(苞)、北海道西南部から九州)3
25264	ミカワチャルメルソウ(<i>Mitella furusei</i>)(30-50、赤紫、自家和合性、雄性不稔の株が一定割合必ず存在する雌性両全性異株とされる)27
25265	チャルメルソウ(<i>Mitella furusei</i> var. <i>subramosa</i>)(20-40、紅紫、本州中部から九州、湿地)3
25268	ツクシチャルメルソウ(<i>Mitella kiusiana</i>)(20-30、淡い黄緑、九州)21
25274	タキミチャルメルソウ(<i>Mitella stylosa</i>)(20-30、紅紫、錦鹿山脈)3
25275	シコクチャルメルソウ(<i>Mitella stylosa</i> var. <i>makinoi</i>)(20-40、淡い黄緑又は紅紫、四国九州)18
25320	アカバナヤグルマソウ(<i>Rodgersia pinnata</i> 'Superba')[種子交換会で精製]20

-----【ユリ科】-----

25620	ヒロハノアマナ(ヒロハアマナ)(<i>Amana latifolia</i>)(葉1-2、白花、絶滅危惧 II 類)2
25886	カタクリ(<i>Erythronium japonicum</i>)(10-15花茎、桃、北海道から九州)35
25887-1	シロバナカタクリ(うるみ白)(<i>Erythronium japonicum</i> f. <i>leucanthum</i>)(咲き始め純白、次第にピンクがかかる)9
25929	イズモコバイモ(<i>Fritillaria ayakoana</i>)(花の形は碗型、薬の色は淡黄、島根、絶滅危惧 II 類)17,35
25929-7	イズモコバイモ(素心)F1のシプリング(<i>Fritillaria ayakoana</i>)[F2]9
25996	フリチラリア メレアグリス(<i>Fritillaria meleagris</i>)(40、赤紫、ヨーロッパ原産)31
26014-2	アワコバイモ(F1素心 × 素心)(<i>Fritillaria muraiana</i>)9
26067	キバナノアマナ(<i>Gagea lutea</i>)(15-20、黄、中部以北から北海道)11
26259-B	オウゴンオニユリ(黄金鬼百合)(ムカゴ)(<i>Lilium lancifolium</i> var. <i>flaviflorum</i>)(オニユリの黄花変種。対馬特産)21
26546	ホトトギス(<i>Tricyrtis hirta</i>)(30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州)8
26552	シロホトトギス(<i>Tricyrtis hirta</i> var. <i>albescens</i>)(20-50、白、北海道南西部以南、林の中)8
26610	ツリパ クルシアナ(<i>Tulipa clusiana</i>)(10-50、白赤、イラク北部～トルコ南部)35



26639 ツリバトオルケスター(タリバトオルケスター)(Tulipa turkestanica)(10-15、薄黄、中央部黄、中央アジア)10



-----【ラン科】-----

27725-B プテロスティリス フルシラータ(球根)(Pterostylis x furcillata)自然交雑種とされる 20、縁に褐色の筋19

27815 テリミトラ パウキフロラ(Thelymitra pauciflora)(20、藤色、早春咲)22

-----【リンドウ科】-----

28093 コケリンドウ(Gentiana squarrosa)(3-10、薄紫、2年草、北海道から九州)10

28101 ハルリンドウ(Gentiana thunbergii)(2-15、薄紫、2年草、実生は難しい、北海道から九州)30

第11回春の交換会(2025年)種子交換会 種子提供者
 (敬称略)

No	提供者名	(栽培地)	No	提供者名	(栽培地)
1	小杉 瑞子	(大阪)	20	金子 久子	(埼玉)
2	中山 俊	(愛知)	21	小川 基之	(埼玉)
3	森川 味江	(埼玉)	22	三津井 教夫	(神奈川)
4	坂本 昭三	(石川)	23	小川 正美	(東京)
5	熊谷 忠男	(神奈川)	24	山崎 崇広	(東京)
6	秋本 靖匡	(千葉)	25	三上 洋子	(東京)
7	岡本 隆然	(埼玉)	26	町田 實	(東京)
8	徳江 久美子	(千葉)	27	行方 崇	(山形)
9	清水 尚之	(新潟)	28	前田 和子	(兵庫)
10	小川 操	(大阪)	29	伊賀 勝	(愛媛)
11	福本 道樹	(香川)	30	橋本 宣子	(京都)
12	村田 富美子	(神奈川)	31	福家 道信	(大阪)
13	小林 正明	(長野)	32	相原英二	(神奈川)
14	上田 晴彦	(広島)	33		
15	岡田 裕策	(埼玉)	34		
16	栗田 敏広	(埼玉)	35	西田 和憲	(神奈川)
17	福島 久雄	(島根)	36		
18	稻垣 聰一	(埼玉)	37		
19	小林 時夫	(埼玉)	38		