

## 種子リスト(スミレの種子の配布会2025.5.20)

番号	和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等)[提供者コメント]
15700	ヒバンスア コムニス( <i>Hybanthus communis</i> )(白、常緑低木、南アフリカ原産)
15721	アマミスミレ( <i>Viola amamiana</i> )(3-5、白、紅紫条、奄美沖縄、絶滅危惧ⅠA類)
15723	ビオラ アポエンシス( <i>Viola apoensis</i> )(3-5小型、淡藤、ニューギニア島の山地に自生する)
15741	ヤクシマリユウキュウシロスミレ(俗称)( <i>Viola boissieuana</i> var. <i>iwagawae</i> x <i>betonicifolia</i> var. <i>oblongo-sagittata</i> )(ヤクシマスミレとリュウキュウシロスミレ交配種)
15744	ヤクシマミヤマスミレ( <i>Viola boissieuana</i> var. <i>pseudo-selkirkii</i> )(白地に紫条、葉はハート形、屋久島種子島固有種)
15765	ヒゴスミレ( <i>Viola chaerophylloides</i> var. <i>sieboldiana</i> )(12、普通は白、九州産には紅がかかる)
15765-3	ヒゴスミレ(素心)( <i>Viola chaerophylloides</i> var. <i>sieboldiana</i> )(青軸)
15767	ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン、濃紅)( <i>Viola chaerophylloides</i> var. <i>sieboldiana</i> x <i>eizanensis</i> )(濃淡の紅が入る。有香)
15767-4	ヒラツカスミレ(くない)( <i>Viola chaerophylloides</i> var. <i>sieboldiana</i> x <i>eizanensis</i> )
15769	黒花ヒゴスミレ(俗称)( <i>Viola chaerophylloides</i> x <i>chaerophylloides</i> var. <i>sieboldiana</i> )(黒赤、ベニバナナンザンとヒゴスミレの交配種)
15798	ツクシスミレ( <i>Viola diffusa</i> var. <i>glabella</i> )(淡い薄紫、開花株の寿命は短い、九州南部から南西諸島)
15798-1	フイリツクシスミレ( <i>Viola diffusa</i> var. <i>glabella</i> )(淡い薄紫、ツクシスミレの斑入り種)
15798	ツクシスミレ( <i>Viola diffusa</i> var. <i>glabella</i> )(淡い薄紫、開花株の寿命は短い、九州南部から南西諸島)
15803	エイザンスミレ( <i>Viola eizanensis</i> )(10-20、淡紅から濃紅紫、芳香、葉は深く切れ込む、本州・四国・九州)
15824	イソスミレ(セナミスミレ)( <i>Viola grayi</i> )(15、濃い紫から薄い紫、北海道から鳥取(日本海側に多い)絶滅危惧Ⅱ類)
15826-15	オトメシチトウスミレ( <i>Viola grypoceras</i> )(タチツボスミレの変種、学名不明)
15831	オトメスミレ( <i>Viola grypoceras</i> f. <i>purpurellocalcarata</i> )(10-20、白、距に淡い紫が残る、箱根で発見)[距だけ有色]
15836	ヤクシマタチツボスミレ( <i>Viola grypoceras</i> f. <i>yakusimensis</i> )(淡い紫、距は白、屋久島固有種、コタチツボスミレの一系)
15852	アオイスミレ( <i>Viola hondoensis</i> )(5-10、白紫、落葉樹林下、日本全国)
15856	ヒメスミレ( <i>Viola inconspicua</i> ssp. <i>nagasakiensis</i> )(濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。微香、低地)
15859	コスミレ( <i>Viola japonica</i> )(淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで)
15859-6	コスミレ(ピンク系)( <i>Viola japonica</i> )[桜色、赤紫芯白]
15859-9	コスミレ(斑入り、詳細不明)( <i>Viola japonica</i> )
15859-7	コスミレ(紫)( <i>Viola japonica</i> )(濃い紫、)
15859-10	コスミレ(赤紫)( <i>Viola japonica</i> )(赤紫、)
15859-11	コスミレ(紅)( <i>Viola japonica</i> )(紅)
15869	ビオラ カムツシャダロルム(オオバタチツボスミレ)( <i>Viola kamtschadalorum</i> )(薄紫から紫、紫条、北海道、高山)
15871	ケマルバスミレ(マルバスミレと呼ばれる)( <i>Viola keiskei</i> f. <i>glabra</i> )(白、唇弁に紫条が入る、青森から屋久島)
15871-1	ケナシマルバスミレ( <i>Viola keiskei</i> f. <i>glabra</i> )(全体に毛がない)
15875	オオタチツボスミレ( <i>Viola kusanoana</i> )(15-25有茎、淡赤紫-淡紫、変化多、日本全土の山地)
15881	ビオラ ラブラドリカ( <i>Viola labradorica</i> )(10、青紫、通称黒葉スミレ)
15883	シロコスミレ( <i>Viola lactiflora</i> )(白、長崎県、絶滅危惧ⅠA類)
15889	スミレ( <i>Viola mandshurica</i> )(通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土)[親株来歴、京都、長崎、野辺山、朝霧高原など]
15896	アナマスミレ( <i>Viola mandshurica</i> f. <i>crassa</i> )(紫、北海道、本州日本海側)
15896	アナマスミレ( <i>Viola mandshurica</i> f. <i>crassa</i> )(紫、北海道、本州日本海側)
15903-1	スミレ「初雪」( <i>Viola mandshurica</i> 'Hatuyuki')(10、スミレの白花変種、新潟で発見)
15905-1	ホコバミョウジンスミレ(俗称、高知産系)( <i>Viola mandshurica</i> 'Myoujin type')(芯赤)
15905	ミョウジンスミレ(俗称)(スミレ濃色)( <i>Viola mandshurica</i> 'Myoujin type')(スミレより濃紅紫、葉も赤み。)
15906	スミレ「彩雲」( <i>Viola mandshurica</i> 'Sai-un')(色変わり淡い藤紫色)
15905-2	スミレ(ワインレッドの花色)「ひむろ」か( <i>Viola mandshurica</i> sp.)
15909	アツバスミレ( <i>Viola mandshurica</i> var. <i>triangularis</i> )
15909-1	紅花アツバスミレ( <i>Viola mandshurica</i> var. <i>triangularis</i> )(紅、伊豆大島で発見)
15910	アツバスミレ「二色アツバスミレ」( <i>Viola mandshurica</i> var. <i>triangularis</i> f. <i>bicolor</i> )(10、白・紫)
15911	ニイジマスミレ( <i>Viola mandshurica</i> var. <i>triangularis</i> f. <i>nijimensis</i> )(10、白、東京都原産)
15930	ニオイタチツボスミレ( <i>Viola obtusa</i> )(濃紫、濃紅紫、中央部白くぬける。北海道西南部から九州)[日光由来]

15944-2	ナガバノタチツボスミレ(八重咲型)( <i>Viola ovato-oblonga</i> )
15951	クワガタスミレ( <i>Viola palmate</i> )(10、青紫、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米)[ビオラ パルマータ]
15954	シロスミレ(シロバナスミレ)( <i>Viola patrinii</i> )(10、白、湿った高原)
15962	アカネスミレ( <i>Viola phalacrocarpa</i> )(基本は茜色、青紫～紅紫、)[松本由来]
15962-2	アカネミョウジンスミレ( <i>Viola phalacrocarpa</i> )(紅紫、アカネスミレの明神タイプ)
15964	コボトケスミレ( <i>Viola phalacrocarpa</i> f. <i>chionantha</i> )(アカネスミレの白花品種、高尾山、小仏峠で発見とされる)
15972	ビオラ プリオナンタ(通称:サキガケスミレ)( <i>Viola prionantha</i> )(やや薄い紫、亜高山、朝鮮半島から中国東北部)
15973	ケイジョウスミレ( <i>Viola prionantha</i> var. <i>sylvatica</i> )(紫、サキガケスミレの変種か、朝鮮から中国東北部)
15977	ビオラ プベスケンス( <i>Viola pubescens</i> )(レモン黄、暑さに強いが、夏は休眠しやすい、北米東部)
15981	タチスミレ( <i>Viola raddeana</i> )(5-10、白淡紫の唇弁に赤紫条が入る、絶滅危惧Ⅱ類)
15986	アケボノスミレ( <i>Viola rossii</i> )(10-15無茎、紅紫、本州、四国、九州、北海道の一部)
15995	ビオラ ルペストリス「ロセア」( <i>Viola rupestris</i> 'Rosea')(桃、園芸種、基本種は山地から亜高山帯)
16003	ミヤマスミレ( <i>Viola selkirkii</i> )(5-8、無茎、薄紅紫、北半球北部)[北海道、オロフレ峠]
16017	ビオラ ソロリア「フレックルス」( <i>Viola sororia</i> 'Freckles')(10、白花に紫砂斑)
16017-1	ビオラ ソロリア「プリセアナ」( <i>Viola sororia</i> 'Priceana')(白、紫筋、園芸種が一部野生化)
16018	ビオラ ソロリア「レッドジャイアント」( <i>Viola sororia</i> 'Red Giant')(濃色マゼンタ)
16019	ビオラ ソロリア「スノープリンセス」( <i>Viola sororia</i> 'Snow Princess')(白)
16023	雲南スミレ( <i>Viola</i> sp.)(紫、アカネスミレに似る、雲南省で採集されたとする)
16040	ヒナスミレ( <i>Viola tokubuchiana</i> var. <i>takedana</i> )(淡ピンク、白、細かい紅条が入る。北海道南部から九州中部)
16050	シロバナスミレサイシン( <i>Viola vaginata</i> f. <i>albiflora</i> )(淡い紫、唇弁に紫条、北海道南西部から山口)
16057	シラユキスミレ( <i>Viola verecunda</i> f. <i>condidissima</i> )(5-20、ニョイスミレの白花品種、日本全土)
16063	コケスミレ( <i>Viola verecunda</i> var. <i>yakusimana</i> )(白、唇弁に赤紫の条が入る、屋久島特産)
16070	フイリシハイスミレ( <i>Viola violacea</i> f. <i>versicolor</i> )(紅紫、葉脈の沿って白い斑が入る、本州四国九州)
16071	マキノスミレ( <i>Viola violacea</i> var. <i>makinoi</i> )(5-10、淡紅-濃紫、六甲山-青森)
16078	ハグロスワキクバスミレ( <i>Viola</i> x <i>chinoi</i> f. <i>sordoda</i> )(薄いピンク、ハグロスミレ(タカオスミレ)×ヒゴスミレの交雑種)
16080-1	アツバヘイリンジスミレ( <i>Viola</i> x <i>hiyamae</i> )(アツバスミレを片親にしたヘイリンジスミレ)
16087	ノジスミレ( <i>Viola yedoensis</i> )(淡紫、紫条あり)
16087-1	ノジスミレ(重弁)( <i>Viola yedoensis</i> )(淡紫、紫条あり)
16087-2	ノジスミレ(桃色花)( <i>Viola yedoensis</i> )(桃、交雑種?)
16090	リュウキュウコスミレ( <i>Viola yedoensis</i> var. <i>pseudo-japonica</i> )(紫)
16093-1	フイリフクザウスミレ( <i>Viola yedoensis</i> x <i>variegata</i> f. <i>nipponica</i> )(ノジスミレとゲンジスミレの交配種)
16095	ヒカゲスミレ( <i>Viola yezoensis</i> )(白地に細かい紫条が入る。)