

余剰種子リスト(第11回春の交換会後)

番号 和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等) [提供者コメント] 「採種地」 提供者番号

-----【アカバナ科】-----

00509 アカバナ(*Epilobium pyrricholophum*)(15-90、紅紫、北海道から九州)3

-----【アブラナ科】-----

00971 ダイセンハタザオ(*Arabis* sp.)(15-20、白)7

01176 シリベシナズナ(通称キリギシナズナ)(*Draba igarashii*)(10-20、白、特定国内希少種、絶滅危惧 I A 類)25

01182 キタダケナズナ(ハクホウナズナ)(*Draba kitadakensis*)(10-20、白、南アルプス、奥秩父、絶滅危惧 I B 類)25

01192 イヌナズナ(*Draba nemorosa*)(10、黄、二年草、北海道から九州、和名は食べられないという意味から)3

01219 シロウマナズナ(*Draba shiroumana*)(10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧 I B 類)25

-----【アヤメ科】-----

01616 バビアナ ストリクタ(*Babiana stricta*)(10-30、紫、南アフリカ、USDAゾーン8-10)35



01785 フリーシア ビリデリス(*Freesia viridis*)(30、緑色の花、半耐寒性→アキダンテラ ビリデリス(*Acidanthera viridis*))10,35

01786 フリーシア ムイリー(*Freesia x muiirii*)(5-15、白にほんのり黄のスポット)35



01877 ヘスペランサ ククルタ(*Hesperantha cucullata*)(15、表は白、裏暗赤、秋蒔き、3~5月咲き、夕方咲き)22



01881 ヘスペランサ オリガンサ(*Hesperantha oligantha*)(10-15、濃桃、秋蒔き、2~3月咲き、ケープ州)[発芽2年目に開花]22,35



02073 ラペイロウシア ヤククイニー(*Lapeirousia jacquinii*)(10、紫、半耐寒性)5,35



02122 モラエア ポリスタキス(*Moraea polystachys*)(40、青紫、秋冬咲)22




02128 モラエア SP-1(Moraea SP-1)(20、黄 中心部に斑点、秋蒔き、3月咲き)22



02298 スパラキス グランディフロラ フィンブリアータ(Sparaxis grandiflora subsp. fimbriata)(10-25、白、裏に紫少々、秋蒔き、4月咲き、ケープ州)22,35



02300 スパラキス バリエガタ(Sparaxis variegata)(20-25、紫、半耐寒性、南アフリカ)35



-----【イヌサフラン科】-----

02549 コルキウム カペンセ キリオラツム(Colchicum capense ssp. ciliolatum)(8、ほぼ白、秋蒔き、1～2月咲き、子苗でも開花しやすいタイプ)22



-----【ウマノスズクサ科】-----

04535 ガビサンカンアオイ(通称?)(Asarum caudigerum var. caudigerum)(緑、中国産、オナガサイシンに似る)[保湿種子、実生での斑入りは未確認]35

04650 サルマ ヘンリー(Saruma henryi)(20、黄、耐寒性あり、中国南部)30

-----【オミナエシ科】-----

05524 オミナエシ(Patrinia scabiosifolia)(60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州)28

-----【キク科】-----

08150 チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピヌム)(Hieracium alpinum)(10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ)17

08159 ウズラバタンポポ(Hieracium maeulatum)(20、黄、紫褐色の斑入り葉)16

08990 シロバナタンポポ(Taraxacum albidum)(30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可能、本州関東以西)23

-----【キジカクシ、クサスギカズラ科】-----

09199 アルブカ スコエンランディ(Albuca schoenlandii)(150-、薄黄、温暖地では多年草)35

09204 アルブカ スピラリス(Albuca spiralis)(15、白、球根、園芸種の「フリズルシズル」より葉の巻きは小さい、南ア・ケープ)35



09419 ヒアキントイデス マウリタニカ(*Hyacinthoides mauritanica*)(10-15、青、モロッコ)35



09431 ラケナリア アロイデス(*Lachenalia (Polyxena) aloides*)(20、赤、黄、南アフリカ原産)35



09433 ラケナリア コンミナタ(*Lachenalia (Polyxena) contaminata*)(30、白、細葉)35

09435 ポリキセナ エンシフォリア(*Lachenalia (Polyxena) ensifolia*)(5-10、ピンク、多肉質葉の間にピンク小花、南ア)14,35

09440 ポリキセナ ロンギツバ(*Lachenalia (Polyxena) longituba*)(-10、白、南アフリカ原産)3

09443 ラケナリア ムタビリス(*Lachenalia (Polyxena) mutabilis*)(20-30、青から紫に咲く、半耐寒性、南アフリカ)35



09449 ラケナリア ブシラ(*Lachenalia (Polyxena) pusilla*)(5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。)1

09452 ラケナリア レフレクサ(*Lachenalia (Polyxena) reflexa*)(10-20、黄)1,14,15,22,35



09453 ラケナリア ルビダ(*Lachenalia (Polyxena) rubida*)(10-25、桃-赤)35



09486-B マッソニア ディプレッサ(小球根)(*Massonia dipressa*)(10、白、2枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)21

09487 マッソニア ロンギペス(*Massonia longipes*)(10、白、4枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)35

09489 マッソニア プスツラタ(*Massonia pustulata*)(10、白、2枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)1

-----【キョウチクトウ科】-----

09813 ヒメイヨカズラ(*Tylophora matsumurae*)(10、黄緑 小さな花)28

09831 ナンゴクカモメヅル(*Vincetoxicum austrokiusianum*)(ツル、花冠は白色、基部が淡紅色、九州南部、絶滅危惧 I B類)8

-----【キンチャクソウ科】-----

- 09903 カルセオラリア メキシカナ(*Calceolaria mexicana*)(30-50、黄、多年草、半耐寒性)[秋播きすれば、翌春に開花、余り暑さに強くないので、1年草扱いが可能]35
 -----【キンバイザサ科】-----
- 09915 コキンバイザサ(*Hypoxis aurea*)(黄、日本では同属種はこの種のみ、宮城以南琉球まで)28
 -----【キンポウゲ科】-----
- 10042-1 シコクフクジュソウ(花はオレンジ色)(*Adonis shikokuensis*)(絶滅危惧Ⅱ類)9

- 10072 オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州)6,13,21
 10072-E オキナグサ(新潟県由来)(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫)9

- 10073 キバナオキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua* var. *flaba*)(30-50、薄い黄)27
 10082 プルサチラ ハレリ スラビカ アルバ(*Anemone (Pulsatilla) halleri* ssp. *slavica alba*)(20、白、カルパチラ山脈西部)21
 10260 バイカカラマツ(*Anemonella thalictroides*)(10-20、平地や山地の林床/林縁)28
 10293 ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶・黄、距が曲がらずまっすぐ、北海道から九州、草地、林縁)30
 10352 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫、葉が3全分裂する。オダマキは完全に分裂しない)7,28
 10352-E2 ミヤマオダマキ(ハケ岳系、ピンク)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、ピンク)25
 10352-E6 ミヤマオダマキ(アポイ岳系)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(青紫)7,18
 10352-E9 ミヤマオダマキ(白馬岳系か)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)7
 10354 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* f. *alba*)26
 10354-2 ミヤマオダマキ(白)(ヤマオダマキとの交雑種?)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* f. *alba* sp)[花は青みを帯びた白、草丈は30-40]30
 10621 セリバオウレン(*Coptis japonica* var. *dissecta*)(10-30、白、2回3出複葉、本州四国)7
 10625 オオゴカヨウオウレン(別名屋久島ゴヨウオウレン)(*Coptis quinquefolia* var. *ramosa*)(5-10、白、屋久島固有種)9
 10718 アズマシロカネソウ(*Dichocarpum nipponicum*)(10-20、白っぽく外は紫色に帯びる。下向きに咲く。)18
 10720 サンインシロカネソウ(ソコベニシロカネソウ)(*Dichocarpum ohwianum*)(5-20、淡い黄(基部赤褐色)、島根県から福井県、湿りけの多い場所)18
 10723 トウゴクサバノオ(*Dichocarpum trachyopermum*)(10-20、白(薄い黄)、日本固有種、本州岩手以南)18,25
 10744 セツブンソウ(*Eranthis pinnatifida*)(5-15、白、関東以西本州、主に太平洋側)1,6,13,18
 10744-s セツブンソウ(*Eranthis pinnatifida*)(5-15、白、関東以西本州、主に太平洋側)[殺菌処理]6,17
 10744-1 セツブンソウ(八重咲き)(*Eranthis pinnatifida*)9

- 10744-3d セツブンソウ(白花)(*Eranthis pinnatifida*)[乾燥種子]29
 キバナセツブンソウ(園芸名)(*Eranthis x tubergenii* (*hyemalis* x *cilicica*))(10-20、黄、日本で出回っているものは、地中海東部原産のキバナセツブンソウ(*E. cilicica*)と南欧原産のオオバナキバナセツブンソウ(*E. hyemalis*)との交雑種という。)2,35
 10745
 10862-3 雪割草(交配種)2、3段系(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)9

- 10862-15 雪割草(交配種)親株「桃色絞り」(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)[乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4
11000 ヒメウズ(*Semiaquilegia adoxoides*)(10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端)2
11020 コハスバカラマツ(*Thalictrum coreanum* var. *minor*)(15-30、薄紫、朝鮮半島)5,35
11081 タカサゴカラマツ(台湾ンバイカラマツ)(*Thalictrum urbainii*)20、白(口紅赤)、台湾原産19
11081-1 タカサゴカラマツ(台湾ンバイカラマツ)白花(*Thalictrum urbainii*)20、白(青軸)、台湾原産19

-----【ケシ科】-----

- 11551 ジロボウエンゴサク(*Corydalis decumbens*)(10-20、薄い紫、実は線形のさく果、熟すると自然に散布される。関東地方から九州)2,31
11555-W (W)エゾエンゴサク(*Corydalis fumariifolia* subsp. *azurea*)(10-20、空色、学名見直し*Corydalis ambigua*から変わる、北海道のみ、本州に分布するのはオトメエンゴサク*Corydalis fukuharae*とされる)[北海道]21
11670-W (W)ヤマブキソウ(*Hylomecon japonicum*)(10-20、黄)[東京都]26
11850-d サンギナリア カナデンス(*Sanguinaria canadensis*)(20-30、白、一重、多弁、八重咲きがある。山地の林床、林縁)[乾燥種子]14

-----【サクラソウ科】-----

- 12381 ルリハコベ(*Anagallis arvensis* f. *coerulea*)(10-20、青紫、1年草、伊豆七島・紀伊半島・四国・九州・琉球)25,29
12471 リュウキュウコザクラ(*Androsace umbellata*)(5-10、白、1年草、中国地方から沖縄、海近くの草地)20,25
12553 シクラメン コウム(銀葉)(*Cyclamen coum* silver leaf)(葉の中が銀色)28
12583 シクラメン ヘデリフォリウム「ルビーストレイン」(*Cyclamen hederifolium* 'Ruby strain')(10、濃いピンク)3

-----【サトイモ科】-----

- 13255-B アルム イタリクム(小球根)(*Arum italicum*)(30-45、白の仏炎苞、耐寒性USDA5-9、地中海沿岸)21

-----【シソ科】-----

- 14633 タテヤマウツボグサ(*Prunella prunelliformis*)(15、紫、ミヤマウツボグサに似るが本種は葉柄がない東北地方から中部地方、亜高山、高山の草地)7



- 14800 アツバタツナミソウ(*Scutellaria tzusimensis*)(10-30、青紫、対馬)21
14711 ハルノタムラソウ(*Salvia ranzaniana*)(10-20、白、日本固有種、紀伊四国九州)19
14790-1 アカボシタツナミソウ(濃色タイプ)(*Scutellaria rubropunctata*)(20-50、青紫、奄美大島～沖縄諸島)35

-----【シュロソウ科】-----

- 14946 シロバナショウジョウバカマ(*Helonias* (*Heloniopsis*) *orientalis* var. *flavida*)(10-20、白、)[少量、乾燥種子、種子交換会で保湿処理]4

-----【スミレ科】-----

- 15765-3 ヒゴスミレ(素心)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*)(青軸)16
15827 シロバナタチツボスミレ(*Viola grypceras* f. *albiflora*)(10、白)16,19
15856 ヒメスミレ(*Viola inconspicua* ssp. *nagasakiensis*)(濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。微香、低地)16
15889 スミレ(*Viola mandshurica*)(通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土)19
15893 スミレ(白花)(*Viola mandshurica* f. *alba*)(白変種)[素心]29
15910 アツバスミレ「二色アツバスミレ」(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *bicolor*)(10、白・紫)16,29
15952 クワガタスミレ(白)(*Viola palmate* white fl.)(10、白、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米)19
15977 ビオラ プベスケンス(*Viola pubescens*)(レモン黄、暑さに強いが、夏は休眠しやすい、北米東部)29
16088 シロノジスミレ(*Viola yedoensis* f. *albescens*)(白)16
16099 アソヒカゲスミレ(*Viola yezoensis* var. *asoana*)(15、春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる)16

-----【センリョウ科】-----

- 16510 キビヒトリシズカ(*Chloranthus fortunei*)(白、花は糸状、岡山香川九州北部、絶滅危惧Ⅱ類)12
16510-1 キビヒトリシズカ(青軸)(*Chloranthus fortunei*)(白、花は糸状、岡山香川九州北部、絶滅危惧Ⅱ類)12
16512 ヒトリシズカ(*Chloranthus japonicus*)(10-25、白)17,21

-----【ツリフネソウ科】-----

17594 キツリフネ(*Impatiens noli-tangere*)(40-80、黄、一年草、北海道から九州)30

-----【テコフィラエア科】-----

17630 キアネラ アルバ(*Cyanella alba*)(白、南アフリカ、耐寒性は弱い)35



17640 テコフィラエア キアノクロックス(*Tecophilaea cyanocrocus*)(5-10、コバルトブルー、アンデス)35

17643 テコフィラエア ヴィオリフロラ(*Tecophilaea violiflora*)(15、小型紫。実生4年で開花。)5,35

-----【ナデシコ科】-----

18392 ハマツメクサ(*Sagina maxima*)(5-25、白、海岸の岩場や砂地、北海道から九州)3

-----【ヒガンバナ科】-----

20528 ハマラッキョウ(*Allium litorale*)(20-30、淡紅紫、関東から東海)20

20560 タマムラサキ(*Allium pseudojaponicum*)(10-30、紫、鹿児島奄美大島、海岸近く)25

20776 ナルキスス ブルボコディウム(*Narcissus bulbocodium*)(10-20、黄、地中海沿岸原産)35



20788 ナルキスス ブルボコディウム オベス(*Narcissus bulbocodium* ssp. *obesus*)(10、濃黄、スペイン原産)35

20797 ナルキスス カンタブリクス(*Narcissus cantabricus*)(白、細い葉、冬咲き、スペイン西部から北アフリカ)35

20828 ナルキスス ロミエウキシー(*Narcissus romieuxii*)(15-25、黄、やや上向きに咲く)35



20840 ナルキスス スカベルラス(*Narcissus scaberulus*)(黄、スペイン原産)1

20841 ナルキスス セロチヌス(*Narcissus serotinus*)(白、秋咲き)1

20846 ナルキスス トリアンドルス(*Narcissus triandrus*)(クリーム、下向きの風鈴の様な花、ヨーロッパ南部)35



-----【ベンケイソウ科】-----

21950 オオベンケイソウ(*Hylotelephium spectabile*)(25-80、ピンク、東アジア帰化植物)[種子交換会で精製]20

-----【ムラサキ科】-----

24351-W (W)ヤマルリソウ(*Omphalodes japonica*)(7-20、淡青紫、日本固有種、福島以西四国九州)[東京都]26

-----【メギ科】-----

24469 イカリソウ(*Epimedium grandiflorum* var. *thunbergianum*)(15、淡桃)[保湿種子]6

24473 キバナイカリソウ(*Epimedium koreanum*)(20-40、薄黄、本州日本海側、北海道)[保湿種子、少量]35

-----【ユキノシタ科】-----

25209 ネコノメソウ(*Chrysosplenium grayanum*)(5-20、淡黄、本州から北海道)2

25210 ヤマネコノメソウ(*Chrysosplenium japonicum*)(10-20花茎、緑(苞)、北海道西南部から九州)3

25264 ミカワチャルメルソウ(*Mitella furusei*)(30-50、赤紫、自家和合性、雄性不稔の株が一定割合必ず存在する雌性両全性異株とされる)27

- 25265 チャルメルソウ(*Mitella furusei* var. *subramosa*)(20-40、紅紫、本州中部から九州、湿地)3
 25268 ツクシチャルメルソウ(*Mitella kiusiana*)(20-30、淡い黄緑、九州)21
 25274 タキミチャルメルソウ(*Mitella stylosa*)(20-30、紅紫、鈴鹿山脈)3
 25275 シコクチャルメルソウ(*Mitella stylosa* var. *makinoi*)(20-40、淡い黄緑又は紅紫、四国九州)18
 25320 アカバナヤグルマソウ(*Rodgersia pinnata* 'Superba')[種子交換会で精製]20

-----【ユリ科】-----

- 25620 ヒロハノアマナ(ヒロハアマナ)(*Amana latifolia*)(葉1-2、白花、絶滅危惧Ⅱ類)2
 25886 カタクリ(*Erythronium japonicum*)(10-15花茎、桃、北海道から九州)35
 25887-1 シロバナカタクリ(うるみ白)(*Erythronium japonicum* f. *leucanthum*)(咲き始め純白、次第にピンクがかかる)9
 25929 イズモコバイモ(*Fritillaria ayakoana*)(花の形は碗型、葯の色は淡黄、島根、絶滅危惧Ⅱ類)17,35
 25929-7 イズモコバイモ(素心)F1のシプリング(*Fritillaria ayakoana*)[F2]9
 26014-2 アワコバイモ(F1素心×素心)(*Fritillaria muraiana*)9
 26067 キバナノアマナ(*Gagea lutea*)(15-20、黄、中部以北から北海道)11
 26259-B オウゴンオニユリ(黄金鬼百合)(ムカゴ)(*Lilium lancifolium* var. *flaviflorum*)(オニユリの黄花変種。対馬特産)21
 26546 ホトトギス(*Tricyrtis hirta*)(30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州)8
 26552 シロホトトギス(*Tricyrtis hirta* var. *albescens*)(20-50、白、北海道南西部以南、林の中)8
 26610 ツリパクルシアナ(*Tulipa clusiana*)(10-50、白赤、イラク北部～トルコ南部)35



- 26639 ツリパトオルケスタニカ(*Tulipa turkestanica*)(10-15、薄黄、中央部黄、中央アジア)10

